



FXAMFS

LABORATÓRIO-ESCOLA

EXAMES REALIZADOS PELO LABORATÓRIO-ESCOLA Consulte o valor da taxa administrativa no site ou whatsapp/telefone

Exames de Sangue

- ÁCIDO ÚRICO
- ALBUMINA
- ALFA FETO-PROTEÍNA (AFP)
- ANTI-ESTREPTOLISINA O (ASO)
- ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÊNICO (CEA)
- ANTI-TIREOGLOBULINA (ANTI-TG)
- ANTI-TIREOPEROXIDASE (ANTI-TPO)
- BETA HCG QUALITATIVO
- BETA HCG QUANTITATIVO
- BILIRRUBINA DIRETA
- BILIRRUBINA INDIRETA
- BILIRRUBINA TOTAL
- CA 125
- CA 15,3
- CA 19,9
- CÁLCIO
- CK TOTAL
- CKMB
- CLORETO
- COLESTEROL TOTAL E FRAÇÕES (HDL, LDL, VLDL)
- CORTISOL SÉRICO
- CREATININA
- ESTRADIOL
- FATOR REUMATÓIDE (FR)
- FATOR Rh
- FERRITINA
- FERRO • FOLATO
- FOSFATASE ALCALINA
- FOSFORO
- GGT
- GLICOSE
- GLOBULINA
- HBA1C.
- HEMOGRAMA COMPLETO
- HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH)
- HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH)
- HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH)
- INSULINA
- LIPASE
- LÍTIO
- MAGNÉSIO
- POTÁSSIO
- PROLACTINA
- PROTEÍNA C REATIVA
- PROTEÍNAS TOTAIS
- PSA LIVRE
- PSA TOTAL

• PTH

- RETICULÓCITOS
- SÓDIO
- SOROLOGIA PARA DOENÇA DE CHAGAS (HAI)
- T3 LIVRE
- T3 TOTAL
- T4 LIVRE • T4 TOTAL
- TEMPO DE ATIVIDADE PROTROMBINA (TAP)
- TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTPA)
- TESTE DE ABSORÇÃO DA LACTOSE
- TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA A GLICOSE
- TESTOSTERONA TOTAL
- TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALACÉTICA (TGO/AST)
- TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRÚVICA (TGP/ALT)
- TRIGLICERÍDEOS
- UREIA
- VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)
- VENEREAL DISEASE RESEARCH LABORATORY (VDRL)
- VITAMINA B12
- VITAMINA D

Exames de Urina

- ELEMENTOS E SEDIMENTOS ANORMAIS (EAS)
- UROCULTURA E ANTIBIOGRAMA

Exames de Fezes

- PARASITOLÓGICO DE FEZES
- SANGUE OCULTO NAS FEZES

Agendamento de exames pelo site: laboratorio.uniceub.br

Horário de funcionamento:

de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h30 às 17h30

Horário da coleta:

de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 10h

Local: Setor Comercial Sul, Quadra 01, Ed. União, 1º Andar (em frente ao Bradesco, ao lado do Hospital de Base)

e-mail: laboratorio@uniceub.br

Telefone | WhatsApp: (61) 3966-1660

LABORATÓRIO-ESCOLA DE ANÁLISES CLÍNICAS **ORIENTAÇÕES PARA EXAMES**















Confira as orientações para que você faça, corretamente, a coleta de material para o seu exame.

ORIENTAÇÕES PARA COLETA DE SANGUE

Preparo Geral

- Estar em jejum de 8h a 12h (É permitido tomar água);
- Não ingerir bebida alcoólica ou drogas nas últimas 24 horas;
- Não fazer esforço físico nas últimas 24 horas;
- ∞ Se usar algum medicamento, informar no ato do cadastro.

Preparo para o PSA

- Após o toque retal, aguardar 3 dias;
- Após ejaculação ou relação sexual, aguardar 48 horas;
- Informar se já realizou cirurgia de próstata;
- Informar se usa medicamento para próstata

Coagulorama (TAP)

• Informar se toma medicamento anticoagulante.

ORIENTAÇÕES PARA COLETA DE FEZES



Modo de Usar

Retire o Paratest da embalagem e abra o frasco com cuidado, para não derramar o líquido conservante.

Com a pá coletora, colete as fezes. Ápenas duas medidas são suficientes para o exame. Em caso de diarreia, ponha três medidas diretamente no líquido conservante.

Dilua as fezes, feche o frasco e volte à embalagem.

ORIENTAÇÕES PARA O EXAME DE SANGUÉ OCULTO NAS FEZES

- Não usar laxativos para colher as fezes (só a critério médico);
- Urinar no vaso sanitário, antes da evacuação, para não contaminar as fezes com urina;
- Utilizar o coletor sem conservante (COLETOR UNIVERSAL):
- Preencher até a metade do frasco, sem enchê-lo completamente;
- Feche-o:
- Colher as fezes do dia e trazê-las, imediatamente, ao laboratório. Se não puder entregá-las no mesmo dia, mantenha-as em geladeira até o dia seguinte;
- Identificar o frasco.

ORIENTAÇÕES PARA O EXAME DE **URINA FEMININO**

- Colher, preferencialmente, a primeira urina da manhã ou após intervalo mínimo de 2 horas após a última urina;
- Utilizar recipiente estéril, fornecido pelo laboratório;
- Rotular o recipiente com nome completo;
- Após a coleta, trazer o recipiente ao laboratório, no prazo máximo de uma hora, desde o momento de sair de casa:
- Informar se está ou esteve em uso de antibióticos e/ou antissépticos urinários.



Lave as mãos.



Afaste os grandes lábios



Lave a região vaginal com água e sabão. Enxague em abundância



para trás, com papel



Comece a urinar no vaso sanitário.



Sem interromper a micção, pegue o frasco coletor e colete, aproximada mente, dois dedos



Despreze o restante de urina no vaso sanitário



Feche o frasco coletor e leve-o ao laboratório imediatamente

• Mulher: No momento da higiene e da coleta, manter os grandes lábios afastados. Lavar a região genital de frente para trás, enxaguá-la e secá-la, usando gaze estéril ou toalha bem limpa. Não usar duas vezes a mesma gaze. Nunca inverter este movimento

- Iniciar a micção. Desprezar o 1º jato da urina, sem interromper a micção e recolher o ato médio, evitando encher o frasco até a tampa.
- Desprezar, também, o jato final. Fechar o frasco imediatamente.
- * É desejável que se faça a assepsia da região genital lavando

ORIENTAÇÕES PARA O EXAME DE **URINA MASCULINO**

- Colher, preferencialmente, a primeira urina da manhã ou após intervalo mínimo de 2 horas após a última urina.
- Utilizar recipiente estéril, fornecido pelo laboratório.
- Rotular o recipiente com nome completo.
- Após a coleta, trazer o recipiente ao laboratório, no prazo máximo de uma hora até o momento de sair de casa.
- Informar se está ou esteve em uso de antibióticos e/ou antissépticos urinários.





(cabeça) e mantenha o prepúcio



água e sabão. Enxague em



papel toalha.



Comece a urinar no vaso sanitário



e colete, aproxi-

madamente, dois

dedos de urina

a micção, peque o frasco coletor



restante de urina no vaso sanitário.



coletor e leve-o ao laboratório imediatamente

- Homem: Lavar as mãos; em seguida, lavar o pênis, retraindo todo o prepúcio, enxaguando e secando com gaze estéril ou toalha bem limpa.
- Iniciar a micção. Desprezar o 1º jato da urina, sem interromper a micção e recolher o ato médio, evitando encher o frasco até a tampa. Desprezar, também, o jato final. Fechar o frasco imediatamente.







